

平成27年度 みつば 登録農薬

H27.4.20

1. 殺虫剤

農薬名	系統	対象病虫害	倍率	使用時期	使用回数	10a当り散布量(ℓ)	備考
コロマイト乳剤		ダニ	2,000	3日前	2回	100～300	
スピノース顆粒水和剤		ヨウムシ	5,000	7日前	2回	100～300	
アファーム乳剤		ダニ・ヨウムシ	2,000	7日前	2回	100～300	
コテツフロアブル		ヨウムシ	2,000	14日前	1回	100～300	
カスケード乳剤	IGR	ダニ・ヨウムシ	2,000	7日前	2回	100～300	
マトリックフロアブル	IGR	ハスモンヨウ	2,000	7日前	2回	100～300	
トレボン乳剤		アブラムシ	1,000	21日前	2回	100～300	
ウララDF		アブラムシ	2,000～4,000	3日前	2回	100～300	
アドマイヤー顆粒水和剤	ネオニコチノイド系	アブラムシ	10,000	7日前	2回	100～300	
モスピラン水溶剤	クロロニコチル系	アブラムシ	8,000	7日前	1回	100～300	

2. 殺菌剤

農薬名	系統	対象病虫害	倍率	使用時期	使用回数	10a当り散布量(ℓ)	備考
モンカト水和剤	カルボキシアミド系	立枯病	1,000	30日前	1回		
ホトキラー水和剤	BT剤	灰色カビ病	1,000	収穫前日	回数制限無し	150～300	
グリーンカップ	BT剤＋銅剤	灰色カビ病、うどんこ病	1,000～2,000	収穫前日	回数制限無し	100～300	
バリダシン液剤5		立枯病	800	21日前	3回	100～300	
カリグリーン		さび病	800～1,000	収穫前日	8回	100～300	
アミスター20フロアブル	ストロビルリン系	灰色カビ病	2,000	14日前	1回	100～300	
ランマンフロアブル	シアノイミダゾール系	べと病	2,000	3日前	2回	100～300	
リトミル銅水和剤	無機銅	べと病	800	14日前	1回	100～300	
タチカレン液剤		根腐病	2,000	14日前	1回	100～300	
トップジンM水和剤	ベンゾイミダゾール系	菌核病	2,000	14日前	2回	100～300	
スミプレント水和剤	ジカルボキシイミド系	灰色カビ病	2,000	21日前	1回		
ペンレート水和剤		菌核病	500	播種前	1回		24時間種子浸漬
リゾレックス水和剤		立枯病	1,000	育苗期但し収穫40日前	1回	100～300	
アリエッティ水和剤	有機リン系	べと病	1,000	14日前	2回		

3. 成長促進剤

農薬名	系統	摘要	倍率	使用時期	使用回数	10a当り散布量(ℓ)	備考
ジベレリン液剤			10ppm	14日前	2回	50～100	1回目:本葉2～3枚時 2回目:1回目の2週間後